



583, 20^e Avenue, Deux-Montagnes (Québec)
J7R 6B2 T. : 450 473-3353 F. : (450) 473-7871

DIRECTIVES CONCERNANT LES CHIRURGIES IMPLANTAIRES

Directives générales

Vous pouvez rejoindre Dr. Jean B. Nguyen, au bureau (450) 473-3353 ou sur son cellulaire (514) 290-7789. Il est très important de prendre vos médicaments tels que prescrit par le Dr. Nguyen.

Directives post opératoires

Le jour de la chirurgie et les 24 hres suivantes :

Votre prothèse vous sert de pansement, ne pas cracher, ni rincer votre bouche.

S'abstenir de boire ou de manger les deux heures suivant votre chirurgie.

Ne pas étirer les lèvres pour voir le site de la chirurgie et ne pas toucher le site avec vos doigts ou votre langue.

S'ABSTENIR DE FUMER POUR UN MINIMUM DE 12 SEMAINES.

Il est normal que votre salive soit teintée de sang pour environ une journée (si le saignement persiste après une journée, vous pouvez appliquer délicatement un sachet de thé humide sur la région)

Appliquer un sac de glace (ou des petits pois congelés) entouré d'une serviette au moins 20 minutes à toutes les heures pour une période de 24 à 48 heures. (N.B. Si vous dormez ne pas vous éveiller pour mettre de la glace)

Restreindre votre alimentation à une diète liquide froide (Boost ou Ensure) ne faire aucune succion et pas utiliser de paille.

Les jours suivants la chirurgie :

Après les repas brosser **délicatement** les dents, en excluant l'endroit opéré et les points de sutures. Ne pas utiliser de pâte dentifrice commerciale, vous pouvez utiliser un mélange bicarbonate de soude et d'eau.

Après 72 hres vous pouvez délicatement prendre des bains de bouche avec de l'eau tiède salée. N.B. Il ne faut pas faire de déplacement d'eau dans votre bouche car cela va nuire à votre guérison.

NE PAS FUMER POUR UN MINIMUM DE 12 SEMAINES. FUMER RISQUE DE VOUS FAIRE PERDRE VOS IMPLANTS OU VOTRE GREFFE OSSEUSE.

Une enflure peut se produire, atteignant son maximum sur une période de 48 à 72 hres après votre chirurgie, elle disparaîtra dans les jours suivants.



583, 20^e Avenue, Deux-Montagnes (Québec)
J7R 6B2 T. : 450 473-3353 F. : (450) 473-7871

Une décoloration temporaire de la peau (ecchymoses) peut se produire, cela est normal et aucun traitement n'est indiqué.

Les points de sutures sont résorbables (fondants) mais ils devront être enlevés 2 ou 3 semaines après votre chirurgie.

Votre diète doit être molle (purée au robot culinaire) pour 2 semaines

4 semaines

8 semaines

Évitez tout entraînement physique pour au minimum 1 semaine

2 semaine

Après deux semaines, une base molle sera appliquée à l'intérieur de votre prothèse.

J'ai compris les directives pré et post opératoires et je m'engage à les suivre pour le bon succès de mon traitement.

Patient : _____

Témoin : _____

Date : _____